

abnormes I 261m | Alter IV 461m; ältere(s) IV 410e, V 76e* :| anstehendes IV 364m, 443m, 479m (510a, 8e), 621e; Anziehung IV (210a, 251e) | [Art] IV 356a, 378a, 474m, 483e; Arten [= Gruppen, vgl. Aufzähl.] IV 256e, V [58, 71e] :| aufsteigend I 282m, [Aufzähl.] (vgl. Arten) IV 316am | ausbrechend [a. Spalten] I 282m; Ausbruchs-G. [= Erupt.] I 258e, 276e; ausgebrochen I 258e :| Benennung(en) I 457(m); V 57e, 59me, 60a; Berührung [= Contact] I 276e | Beschaffenheit [vgl. Natur, Eigensch.] IV (304a), V 31e; -B. IV 307e :| [Bestandtheile] (± Zusammensetzung) IV 580a* || bildend I 268m, Bildung IV (251e) | -bildung [a. Vulkane, vulf.] IV 213me, 510m; pl. -en (*): krystallinische IV 214a, 444m; secundäre V 66e*, vierfache I [259-260] || Contact [= Berühr., Nähe] I 258e, ~s-Dichtigkeit I 425a, Druck I 469a; [Eigenschaften] (adj.) IV 241m, 392a, 410e; Einwirkung IV 93e-94a, 112mell | endogenes [± hyp. Eruptionss-] I 258e, 261m, 7me, 276e, 457am,e; V 57m (59m), 71e, 86m: 2 Arten V 59me, [Begr., Name] V 89m :| erhärtet [= erstarrt] I 259a, 266a; II (389m), V 66e (Zeit); erschlittert I 320m, erstarrt [= erhärtet] I 266a || Eruptionss-G. [= Eruptiv-, Ausbruchs-, endogenes, vulf.] I 258me, 9e* [261m-4m, A. 458-9a], 262a,e*, 4a,e, 7me [268e-281, A. 459-465], 269m,e, 271m, 2m, 3e, 4a, 5e, 9m, 280e, 1e, 3m, 299a, 300a, 457a; II 391a, III 5m, IV 477e*, V [57m] (59me): altes IV 622m, 2 Arten V (59mell), [Bestandtheile] IV 622m, höchstes IV 425m; Umwandlung, die es bewirkt I [268e-281, A. 459-465] | Eruptiv-G. [= Eruptionss- usw., eruptives] IV 270m; V 59me, 71e; eruptives [= Eruptiv- usw., = vulf.] IV 461m (Arten), V 59m :|| exogenes [= Sediment-G.] I 457am; V 57m (59m, 75a, 86m), 89m [Name, Begr.]; [Farbe] IV 447e, festes V 23m, fragmentarisches IV 589e; -gänge I 270m, 9e-280m; [in Gegenden, an Orten] IV 467a, 531am; geschmolzen I 258e, IV 515a; Gewebe I 258e (267e); Gruppen [= Arten] IV 316a, 461m; Hervortreten I 276e; -klüfte IV 238a, 265a; krystallinisches I 245e, II 391a; -lehre = Lithologie; Leistungsfähigkeit IV 37e, 39a || magnetisches IV 208m, 9a | Magnetismus des G. [= Polarität] IV 209e-210m (Einfl. der äußeren Luft), (210a,m); -(s)-Magn. IV 149am (Prüfung der Stärke), 208m :|| -masse IV 575ell, -massen IV 354m | massiges I 261m, II 391a :|| Metamorphose [= Umwandl.] I 269me, 272a | metamorphosirtes [= umgewand. usw.] I 258e, 281e, 457e; V [57m] 69e*, 71e (75me) || Nähe [= Contact usw.] I 258e, 273e; Natur [vgl. Beschaff.] IV 93e, Nebeng. I 279e, neptunisches V 59am, neuere V 76e*, niedergeschlagenes V 59m, Orte s. Geg., paralleles V 93e, permeables V 31e, von Pflanzen überzogen I 372e | plutonisches [= unvulf. V 28e, ± vulf. V 57m] I 258ell, 272m, 280e, 2m, 457am; IV 477e*, 622m; V 28e, [57m, 59ell]: [Bestandtheile] IV 632m; [in Gegenden] IV 424a, 590e; V 28e; [Name] V 59e; und vulf. V 57m, 71e | Polarität [= Magnet.] IV [209-210m] 209e, e-210m (Einfl. der äußeren