

Figur [= Gestalt, 22] IV 575e; Finsterniß (durch den Ausbruch)* [= Verfinst.] IV 286e, 589m; V 49m; flache IV 519e ||— Flämmchen V 47e-48a* :|| Flammen (aus B., ausstoßend; bei Ausbrüchen) [§. Par. 17] I 246e-7a; IV 304m,e, 9e, 335e*, 382e-3a*, 552m*, 575m*; V [45m-48a, A. 56] 45me; sing. Flamme (°°) IV 295e-6a*, m*, 8m, 448e-9a*, 530m, 2am*, 574e*: [Aufklärung] V 46-47m, [Aufzähl. von Vulc.] V 46a, woraus kommend V 45m | -Ausbrüche I 255m, IV 525a*; -Ausbruch IV 311e* :| frühere Erklärungen V 45m-46a, 56m; -Erscheinungen V 45m-46a (zweifelhaft); gelängnet V 45m-46a (45e), 56m; Mangel I 254m, Meinungen vieler Pers. V 45e-46a, Reslege V 45me; bei Tage* IV 451e, 525a :||flammender [17] IV 543e* —|| Flüssigkeiten (ausgeworfen) IV 572e ||— Form [= Gestalt, §. Par. 22] IV 386e; pl. Formen (+) III 509a, IV 324a: ähnliche IV 275a+, 473e; alte IV 425a, conische IV 442a*, primitive IV 284a; regelmäßige IV 549m, R-keit IV 329am; seltne IV 524m, sonderbare+ IV (283e-4, 331m) :|| Formationen [= Gebirgsarten, Par. 19; vgl. °Gebirgs-§.] (als Sitz der Vulc. usw.); vulk. Form. (°) IV 370a, 440e: älteste §. Sitz; von den Vulc. durchbrochen, welche die B. durchbrechen IV [461e-5a, A. 613-4]; Verschied. der §. IV (465a); neuere §. Sitz | als Sitz der Vulc. u. vulk. Tätigkeit: in welchen §. er ist IV [461-5a, A. 613-4], in verschiedene verlegt IV 461-2a; nicht unter die ältesten, neuere IV 461a :| vulk. §. vor den Vulc. aus Spalten ausgebrochen° IV [269-270m, A. 514e-5m] 270a; verschiedene §. Sitz, B-heit §. durchbrochen :|| vulk. Formation° IV 349e, 598a, 618a —|| Furchungen [= Durchforschung, untersucht] IV 561m, Fragmente IV °372e | vulkanfrei [§. Par. 28] IV 547m, 8a: Raum IV 547e-8a :| Frequenz [= hp. Häufigkeit, Par. 29] (§. Ausbrüche, Inseln) IV 452a; Furchen V 38a, -en IV 560am | Fuß IV 329m*, 463m: am §. IV 358e, 562a*; Ausbruch am §. I 245e, Ausbrüche it. II 109a; Lava daraus IV (552e) || Gas (aus Vulc., B. Gas aushauchend) [§. Par. 5] IV 213m, [458m-460, A. 611m-3a], 602e-3a (3a), 4m; V [46-47m], (92a); pl. Gase (°°) IV 603a; Gas-Arten (+) IV 215a, 268m, 458e, [459m-460m, A. 612-3a (bes. Zusammensetzung, vorz. ihr Stickstoff-Gehalt)], 604m: Bestandtheile [§. auch pl. allg.] IV 460m+, 602e-3a, 4m, 612a; V [46-47m+]; -Emanationen IV 461a, -Exhalationen IV °458m; Einwirkung auf die Zusammensetzung der Luft IV 458m-9m, Quelle IV 461a; Stickgas IV 459a, Stickstoff §. pl. allg.; welche Vulkan-Theile Gas ausstoßen IV 458e, Zusammensetzung §. Bestandth. u. pl. allg. :|| Gas-Vulkane [= Salsen] IV 211m, 3me | Gas-Vulkan (sg.) (von Galera Zamba; §. das) IV 261e-2a: was er auswirft IV 261e, 2a; Flammenausbruch u. Umwälzung dadurch IV [261m-2m]; Gas IV 261e, 2a; unterseeischer IV 262m || Gattungen §. Arten, Vorfürer || Gebiet (bes. vulk.) [*Par. 18] IV (311a, 323me, 410e, 5m-6m), [427e-9a (8a, m)], 438e-9a (9a), 524e, 597e | pl. Gebiete [= Systeme] I 226a; IV [303e-5m], 439a, 622m: [Aufzähl.] V 58e-59a, Eruptions-Massen