

IV 636e, 7a, e | aus Spalten ausgebrochen IV 351e-2a, m, 425e-6a: in alter Zeit, früher IV 269m-270a, 573a; V 23e; in der Urzeit IV 460e: | Streifung [vgl. gestreift] V 84e-85a (gefärbte); Structur [= Bau usw.] I 219m, V (73a) 93m; Temper. IV (635a, 7a), Tiefe s. Existenz; Übergang, -gänge V 73ell (gleich in Ländern), 77m\*, e, 84e, 93 (allmählicher, durch innere Entwicklung); umändern [= -wandeln] I 274m; umgewandelte [= metamorphosirte, † verändert] I (163e) [267m-281, N. 459-465m], 275m, 8e, 284a; IV (13e); V 70m [einzelne], (75me), 83e-84a\*; Umwallungen in Geb. IV 274m-5a || umwandeln [= umändern] s. bei Umwandlung, vgl. umgewandelt; -eind I 257e, 269a (276e) | Umwandlung [Sp. = Metamorphose, † Veränd.] (umwandeln) I 163e, 258m [267m-281, N. 459-465m (durch Contact)], 268a, e, 271m, 4a, m, 6a, e, 7ell, 280m, 1m, 462me; IV 252e; V 57a, [70e-71 (Erklärung, Vorgang)], 75me, 76a [93]: Vorgang V [70e-71, 93me], durch vulk. Thätigkeit V 57a || ungemengte IV 474e\*; -schichtete I 258m, 270m; unsmelzbare V 95e; Unterscheidung V [59], -schieb [= Verschied.] II 392am; -suchung V 93a, unvulkanische s. vulk. G || uranfängliche (oft: sogenannte) I 226m\* (274e); IV 294a, 421m, 463m; V [66e-68m, N. 89me] 66e-67m [70m-71]: Auflagerung, jüngeres Vorkommen V 67m-68m; [Aufzählung] V 67m, 70a, 89m; häufig (od. wesentlich) eruptiv od. plutonisch V 67am [70]; [in Gegenden] IV 464m, V 67m-68m; jünger s. Auslag., pluton. s. eruptiv, sind manchmal umgewandelte Sedimentschichten V 70m, Umwandlung V [70e-71 (Erklärung, Ursachen u. Art)]; ohne Verstein. V 66e, 67a; vormalig so genannt V 70a; Zurücknahme des Ausdrucks V 67am, 89me || Veränderung, verändert [† Umwandlung, umgewandelt usw.] I 272e, 3e (7e); IV (578e), V 93am (langsame); Verbindung [= Gesellung; s. Associat. der Mineralien] IV (636e-7a) | geogr. Verbreitung I [283], IV (642a); weit verbreitete V (75a\*) 94a | vereinzelt IV (636e); Vereinzlung (v-tes Vorkommen; Gegentheil von Vorherrschen, Association) IV 636e-7a (6e): | Verglasung IV 578e; Verschiedenheit [† Unterschied, heterogen] IV (35a) 222m, 637a; Verwandtschaft (einiger) IV 462a; Vorherrschen (einer Geb. in einer Association), v-ent IV 636me, 7am (a) | Geb. in oder nahe Vulkanen; vulkanische Geb., vulk. Bildung; Einwirkung der vulk. Thätigkeit auf die Geb. s. \*Vulkane: Gebirgsarten | Wärme V 90m: -Capacität IV 239a; -leitung ib., 369m, 458am: | Wechsel (in den Formationen) [= Abwechslung] V 74m, e; Wiederkehr V 74m, e-75a; zerriebene I 164a || zusammengesetzte I 260e-1a, II 391a, V [72-73m]: zu einfachen V 72a | Zusammensetzung [† Bestandtheile] IV 35a, 275a, 310m, 396e, 465m\*; V 23me: gleich in verschiedenen Ländern V 73m, 74a; mineralische V 57m || Zusammenziehung IV 579a, Zustand [s. auch Natur] IV 578e (Veränderung) \*Gebler V 83e (Thonschiefer), geboren IV 282e (in Gegenden); gebrannt IV 357a, 464e | Gebrauch: Nicht-G. II 225m, 489a; gebraucht III 36m