

350m, 2m [364–6m]; II 214m, 249e, (322e) 421m, 483am; IV 431e, V 88a; plur. Klimate (durch * bez.) I 341m, 7m, 380m; II 70a, 124m, 446m, 483m, 5m; III 48e, 450e, 1m, 8e-9a | B. Klimatisch (durch ° bez.) [s. Isothermen] I 375e, 9m, 490m ||: Busähe: wovon abhängig [= Einfl., einwirken] I 97e, 304m, 317m [343–358m, A. 480–4], 352a; II 483m; III 403m[e], 450am,e, 1m; A-keit II 284a*: | Abstufungen II 88a°, Ähnlichkeit. III 444a; alle* I 378m, unter allen II 259e; anderes II 314m; astronomische* III 450m, 8m; ausgleichend I 323a*, begünstigte II 32m*, Behaglichkeit. I 349a°, Beständigkeit. I (323m), Betrachtung I 342a°, Contraste II 313a* || Einfluss [= abhängig, einwirken] I 343a, 7; II (38a Folge), 195a°, 431a*: auf die Menschen II 431a*; auf Völker I 380m, 4e; II 242a | was auf das Kl. einwirkt, Einfl. auf es hat [= abhängig, vgl. Einfl.] I 328m, III 457e-9a: Hochebene V 88m || excessive I 347me*, extreme* [vgl. Zustände] III 450e (2a); ferne II 84e*, Folge s. Einfl. | [früheres] (vgl. Urzeit, Veränd. usw.): die gemäßigte Zone hatte früher tropisches Kl. II 392m, der Norden? III 456a :| gelagert s. über, Gleichmäßigkeit. I 302e*, Grenzscheide I 319a*; heiße(s) I 349e, II 32e*; individualisieren I 352m, jetzige I 237a*, Kälte V 88m, kühles I 321e; [eines Landes] (s. viele Länder) ... IV 158e, Landkl. II 483m; Mäßigung II 234a || Milde II 38m, 42e, 150m, 270m: entwidert die Menschheit II 234a | mildes [= sanftes] I 348e, 350e; mildern I 323a* || Modificationen [= Veränd.] II 378m°, nördliche II 54a*, von Örtern II 421e*, sanftes [= mildes] I 351a, schichtenweise s. über, schlechter s. verschl., Seekl. II 483m, Störungen I 364m-6m° | Kl.* (pl.) schichtenweise über einander gelagert I 354e, 374e; II 238a, V 88m; das Übereinanderliegen II 188e*: | vom Kl. unabhängig II 259a, unwirthbares II 275m; in der Urzeit, Vorzeit [vgl. früher., Veränd.] I (292e), V (74a*) | Veränderung [= Modific.; vgl. früher, Urzeit, Verschlecht.] II 317m; III 450am, 2e-3a; IV 54m*; pl. -en (**) II (378m) 458a, IV 457e-9a (8a, e-9a): auf d. Mars III 513a**, plötzliche II 459a, der Norden früher tropisch? III (456a) :| Verbreitung° I 15m, 61m; Verhältnisse II 46m; [b] I 182e, 308e, 326a, 343a, 350a; II 72m, 324e; IV 43m, 445a || verschieden [= anderes] IV 17e-18a, unter v-nen III 84e*; v-artige* II 93e, 167a, 215e | B-heit (pl.) I 53a, 304a; II 186m, 251a, 323m, 421e, 483me; III 7e: nach Breite u. Höhe IV 158e; B-heiten I 249m° || ob es sich verschlechtert hat I 182e-3a, B-rung I 24m*; Vertheilung* I 29m, II 313e; [b] I 54e, 335m; II 136e; Vorzeit s. Urzeit; Zone° IV 233m, -en IV 69e; Zustände III 450-1m (extreme) ||— Klimatologie I 341e, 471a; III 256m, IV 505e: vergleichende I 340a | -logie (der) IV 506a, f-logisch IV 506a

*fingen I 214e; -end IV 344e (hellfl.), 423m (Massen); Klingenstierna (Sam., 1698–1765) III 78e (Refractoren): Klinkenberg (Dirk, 1709–99) III 557m (Comet) | Klippen (auch in comp.) [s. Basalt, Inseln, Luftmeer,