

-bewegung I 192a, 398e; Fortrüden I 131m, 398m; III (518a); -linie I 132e (Fortrüden), III 518a (einer Planetenbahn); -linien ib. (Bew.); [von Pflanzen] II 190a † knotig IV 365m || knüpfen s. Band

Kobalt I 135m: magnet. I 186m, 429me; -Massen I 429e; in Meteor-eisen III 614e, 7a, 624m; paramagnetisch V 11m

Koch 1) (in Alabama) II 519me (Hydrarchus) | 2) Jul. Aug. (1752-1817): veränderl. Stern III 241e, 3m, 9e: || Kochen V 34e, R. [s. Moya] I 226a; kochend [s. heiß] IV 337a: || Koch- [s. Brunnen, Quellen]: Kochsalz I 245m, 254a; IV 257e, 267a, 602e: [als Bestandth.] IV 512m, Entf. I 254a, -Sublimation IV 602e, Vorkommen I 245m; in Vulkanen I 245m, 254a; IV 602e; Product der B. IV 612e

Kodros I 187a, *Kofusi* (erlosch. Vulkan auf Sifos) IV 401e, *Kohibaba* (Gebirge Indiens) II 188m

Kohle (meist = Steinkohle) [s. Batterie, Buchsbaum, Kalk, Kalkstein, Oxid, Wasserstoff] I 135m, 277m, 295e; IV 67m; pl. Kohlen [durch * bez.] (auch in comp., 1mal Kohle-) || Zus. (meist compos.) [† -säcke u. -säure usw. bilden bes. Art. hiernach]: kohle-abscheidend I 209e, Allotropien V 7me; k-artig III 541e-2a, 613m | -bergwerk [= -grube] I 417am, 427a; IV 37a; pl. -e IV 180me: | [als Bestandtheil] I 135m, 221a; IV 220a, 3e | -flöz I 419e; -flöze I 295m, 469a: | -formation I 289a, V 72e; -Gebirge I 27e, 266e, 295m; V 90m (Entf.); [in Gegenden] ... IV (558a*), k-gesäuert I 265e, glimmende III (541e-2a*); -gruben [= -bergw.]: tiefe I 417, IV 113a; k-haltig V 71m; -lagen [= -schichten] I 295m, -lager IV 460e (Dicke); starkes Licht aus R. III (397me) 419a | magnet. Einwirkung I 135m, V 36m; Magnetnadel IV 67m: | in Meteor Massen I 135m; † -säcke, -säure usw. sind bes. Art. hiernach | Schicht: dünne, welche in 100 Jahren aus Waldungen zuwächst [vgl. verwand.] I 295e, 469a; IV 460e (auch in d. Urzeit); -schichten IV 413m, 558a: | -schiefer IV 512a [in Gegd.]; -spitzen I 206ell, III 397m | -stoff I 227m, 333e, 469a: k-arm I 14a; [als Bestandth.] I 227m, V 91m; k-haltig I 272e, 9a; in Meteor-eisen III 614ell, 7a: | auf R. streuen II 387a; in R. verwandeln [vgl. Schicht] I 295m, 469a; Wachstum s. Schicht; aus Waldbäumen, Waldungen I 295e, IV 460e; Zwischenräume IV 174a ||— † die **Kohlenfäcke** (am südl. Himmel; im südl. Kreuze III 345m) [zwei; wahrsch. nur einer (im Kreuze)] II 328am, 330m; III 38e, 311a, 346me [349e-352, A. 369m-370a], 350e-1a; auch gen. die schwarzen Flecken (im Bb. III Hauptform) II 323a; III 38e, 151am, 311a, 349e, 350m,e: | zwei R. III 350e-1 (1a), nicht zwei III 351me; zwei Flecken III 351am, 369m: || sing. der Kohlenfäcke 1) (der große) [s. seine Zus. unter *] III 186mll, 7a, 352a: einer III 209m; im Kreuze III 351m (2a), 370a; = der schwarze Flecken III 345m: im Kreuze III [351-2] 1a,m, 369m † der große R. III 345m, 350e-1a: im Kreuze III 351a,m; der größere II 330m; = ein Canopus III 209m, 345m † 2) der