

[36] : Bohrloch I 416e, 7a, 426a; IV [36]e, 165a: Tiefe I 416e; IV 36m, 165a :| artes. Brunnen IV 35m, Temper. der Luft IV 36me; Soolquelle IV 36m || Neu-Schottland II 457e (986 gesehn), = Nova Scotia II 272m || Neu-Seeland I 307e-8a; IV 421a [422-3]: höchster Berg IV 422e | Gebirge IV 422me; ~arten, geogr., Geologie IV 421m, 2a,m, 3m :| Gestalt IV 422m | Nord-Insel IV 421a,m, 2a,am, 3a; südl. Insel IV 421a :| Karte IV 590e, Regel IV 422me; Lage IV 588a,e; in Polynesien IV 588a, heiße Quellen IV 423a, Richtung IV 421a, Schneeburg IV 422e, [Schriften] IV 422a, Seen IV 422e-3a | Solfatare IV 422e, 590e; -en IV 423a, 458e, 590e :| Südsee IV 451m; [Topogr.] IV 421a,m, 2am, e-3a; foss. Vogel I 303a | Vulkane IV [422-3] 430m, 590e; vulst. IV [422-3], 2 (Zone), 458e :| Westküste IV 423a || Neu-Sibirien (Insel) I 469m,m (hölzerne Berge); IV 42e-43a (Inseln) | Neu-Spanien (= sp. Mexico): Atlas IV 432m, Er-oberer II 309m, Gesch. IV 570m, Höhen IV 434e; Karte IV 312a, 593me; tropischer Theil IV 593m :| Neu-Süd-Wales (New South W. IV 589e) IV 589e (Beschr.), 590m (Säulen-Basalte) | neutral I III 370e (Punkte), III 135m (Richt); neutralisiren III 134e (einander), 396a | Neu-Valencia (Nueva V. I 229m; IV 245e-6a,m; V 78e): See IV 246m, V 78e (= Tacarigua); Stadt V 78e-79a (Filibustiers) | Neuwied I 281a; -er Becken ib., 518m || Neu-York A. Staat I 225e, IV 257me (Brenngas-Quellen) | B. Stadt (New-York s. soc.) II 270m: Breite IV 90e, Länge III 95a; magnet. Intens. I 194a, IV 90e; Pendel I 424a, IV 29a; [Pers. da] III 261e, New York society I 444e, Temperatur I 342m

+ **NEU-GRANADA** (vgl. Nueva Gr.) IV [554m-7]: Andes [= Cordill.] I 12a, V 50e; -ette IV 554a (Zusammenhang) :| Bergsystem IV 556m, [Be-schaff.] II 54a || Cordilleren [= Andes] IV 268e, [553e-7], 623e: [mauer-artig] IV 431a | Cordillere: die mittlere IV [555m-6m], V 27e; die östl. IV [556-7m], die westl. IV [554m-5m] || Erdbeben I 214e, 5e, 221a; Flüsse IV 556m, geogr. V 52m, Geschichtsschreiber IV 166e; Hochebenen II 315a, Höhenbest. IV 623e; Karte IV 428a, 554m; Landspitze IV 428a, Mastodonten II 315a, [Ort da] IV 116e, paramos IV 555e, Pflanzen [= Veget.] I 377a, [Schrift] IV 511m, Tiefstaub IV 556m, [Topogr.] IV [554m-7], Vegetation [= Pfl.] V 50e, [Voll] III 455a ||— B. Vulkane von Neu-Granada (großenteils: Reihe-B. von N. Gran. u. Quito; die von Quito s. aber auch bei Quito unter °) [s. °Pasto, °Popayan] IV (305e), [313e-5m, 8e-320a], 548m; sg. Vulkan (*): Aufzählung IV 314am,e, 9am, 460m, 471e, 490a, [548m (bis Chili's)]; was sie aussprühen I 445e, -werfen IV 353a; besucht IV 302a, 5e; Entfernung von den B. Central-Amer.'s IV 547a; noch entzündete IV 315e, 8e; Erstreckung, Länge [s. auch bef.] IV 313e-4a, 547a,m; Gas IV 460m; Gebirgsarten, Mineralien IV 460m, 480a || Gruppe IV 315e, 6e, 7e, 547a, 8a,m; -Gruppe IV 547m | 4 kleinere Gruppen IV 318e-9a || historische IV 446m (Zahl) | hoch IV 308am; Höhe ib., 325a || :