

IV 237am; gegen Flüsse [vgl. Art.] f. Verhältniß:| friedlich IV 232e || Gas, Gas-Arten (IV 252e; Gase IV 250am) in Qu. IV 248m, 9a,m, 250m, 4am, 579a: aus Qu. aufsteigend IV 212e*, den Qu. beigemischt IV 211a, [als Bestandth.] IV 502e* | Qu. von Gas IV 267m | Gasquellen IV 249e-250a, 3a, 7me, 262e, 4e, 6m-7m (7a); sg. -quelle IV 296e-7a, 380e: [Aufzählung, Gegenden] IV 458e, auf Java IV 264am || -gebiet II 146m, IV 611m || auf Gebirgen [f. auch Höhen] IV 234a, 5me | Gebirgsqu. IV 235me, 249a*: Einwirkungen auf G. IV 239e-240a, höhere IV 239e; Temper. IV 244a, 499e; mit andern Wassern gemischt IV 239e: || Gebirgsarten, aus denen sie ausbrechen, hervorbr. [f. *Granit] I 229m,e; [b] IV 245me, 6all, ell, 9e, 514me; V 80m, 94a, 96e | Berührung mit G. V 079m: || [in Gegenden, Ländern] (vgl. Lage) [a. Gasqu., kalte, Mineralqu., Schwefelqu.] [b] IV 224e-5a, [245-8a, 2. 500e-1m], 257m, 352e, 423a, 4m, 442e, 514me, +e, 611m; V 79a, 96e-97a; [e] IV [235] 8am, 252m, 498e, 501a || -gemächer III 115m, gemischt [vgl. vermischen] f. Gebirgsqu., (rein) geologische [= beständ.] (f. meteorol.) IV 504m; [Gesch.]* IV 234am, 498m; gespeist IV 248e (durch Meteorwasser) | [(Bestimmung) in Graden] (f. kalte) [b] IV 245e, 6am, 7a,m,e, 8a, 251a, 338am; V 80e; [e] IV 223e-4a, 233e-4a, 245m, 497a, 500e, 1e, 611m; V 96e-97a; B-grade IV **234a | Heilqu. IV 225e, 248e: [Aufzähl.] IV 501me: | heilige II 99m; heiße Qu. bilden als B. oder unter einem ° einen Bestandtheil dieser großen Vereinigung; herabkommen f. Höhe, heraufbringen f. Stoffe | hervor-: -brechen f. ausbr.; -kommen [= ausbr. usw.] IV 506a*,m; H-lochen II 170a (bei den Strustern) || — hohe f. Höhen; hohe L.* [= sehr heiß] IV [245-8a] 5am | höhere [f. Gebirgsqu., Luft] f. erhöhte, höchste IV 238me: || Höhe (in der sie ausströmen), Qu. auf Höhen [f. sogl.] IV 234a, 506m: || von der sie herabkommen IV 252e, zu kalt für die G. IV *506e | Qu. auf Höhen [vgl. vorher] (auf Gebirgen, Bergen) [f. auch Gebirge], hohe Qu. (f. hp. bedeut.): [a] IV 235me, 9e; [b] IV 245m, 7a, 500e, 579a; [e] IV 235me, 244a, 499m, 506me: Abnahme der L. [e] IV 237a, 9e-240a, 499m: 1° IV 239e-240a; auf bedeutenden G. IV [237-8], *ib. (der unveränderl. Qu.); Einwirkungen darauf, was Einfl. hat IV *239e-240a; Kälte* IV 252e, 506me — || innere W. f. Wärme; intermittirende I 228a, 249a; IV (227e), °247a, °8a | mittl. Jahres-L. IV *233m*; Jahreszeiten f. unveränderl., veränderl.: | kalte Qu. [f. Höhen, vgl. -wasser] I 228e-9a; IV 500a,m, 2e-3a*: abnorm f. IV 252e [506me], [Begr.] IV 233m-4a*, Bestandth. IV 249m, [in Gegd.] V 79e, [in Graden] IV (238m), sehr relativ IV 233e-4a, warme u. f. IV [233-4a] Eintheilung (unbestimmt u. schwierig) | | kältere [f. Luft] IV 38a; Kälte [f. Höhen] IV 252e, 506m || Kenntniß IV °252e (Wichtigf.), Kochqu. f. *Island; Kohlensäure (als Bestandth.), kohlen-saure IV 249m-250a,e; nach der geogr. Lage, nach