

(522e, 9m) |: Partial-S. III 281e, 463e-4a; Particular-S. III°276e, 373a, 587m; partielle S. III 514e | die Tr. bilden untergeordnete Systeme (unter den Planeten), unterg. Syst. der Tr. I 102e-3a; III°276e, 461a, 3e-4a: Analogien mit dem Sonnensystem III 461am || Umlauf I (145me*): Periode I 103e-4a, ~zeiten II (357e Quadrate):| unser Tr.* s. Mond, unsichtbar III 306e; Vertheilung [± Lage] III 461me (ungleiche), Volum I 101e-2a; Tr. von dunklen Weltkörpern [vgl. °Centralkörper, °Firsterne] III 270a || Zahl I 94e, 99e, 100e, 3a; II 366m (513e); III (24e) 76a, (264e), 420m, 460am (587m): Vermehrung III 521e-2a | -zahl III 522a

trabes (bei Plinius) I 410e-1a (Zodiacallicht!)

Trachyt (vorzüglich als allgemeiner Name oder als Repräsentant der vulkanischen Gebirgsarten; der Art. enthält auch alle Hauptarten für Vulkane mit) (= Trachytgestein) [s. Gerüste, Lava, Mühlstein, Porphyr, Quarz; Ätna, Chimborazo, Pichincha, Toluca u. viele andre Vulkane] I 219a, 264a, 282m; IV [467, A. 577e-8a], 484m, 617am; V 75e-76a; plur. Trachytes (durch * bezeichnet) I 270e-1a; IV 280a, [465e-486a, A. 618e-642a], 474a || B. trachytisch [durch ° bezeichnet] (± trachytartig) [s. Albit, Glockenberg, Kegelberg, Krater, Lava] (untrachytisch s. bei II) IV 629e, V 43a || Parallelen (der Synonyma) in den Zusätzen: 1) Arten, Abänderungen; Abtheilungen, Eintheilung, Anordnung, Classification, Gruppen, Gruppierung; Eigenschaften, Farben; -gestein, -Formationen; 2) Bestandtheile, Gemengtheile, Einschlüsse, einschließen; Zusammensetzung, Analyse; 3) Erhebung, gehoben, emporheben, Emporheben, aufsteigen; Ausbrechen, Ausbruch || Zusätze (in compos. Trachyt-): Abänderungen [s. Par. 1] IV 469ell, sich abstoßen s. Basalt ||— sechs Abtheilungen der Trachytes (pl.) [= Gruppen, Arten; s. Par. 1] (d. h. wesentliche, Haupt-Bestandtheile) [die unwesentl. Best. s. °Bestandtheile] IV 468m, [469-473a, A. 619m-632m], 476am, 8m; V (23me): Künstige Vermehrung IV 473me ||: erste Abtheilung [glasiger Feldspat] (= eigentliche Tr. IV 472e*) IV [469am, A. 619me], 472ell, 8a, 621a | zweite Abth. IV [469m-470a] 478a | dritte Abth. [diorit-artige Tr., Hornblende IV 478m] (= Toluca-Gestein) IV [470-1m, A. 621], 474m ||, 8m, 620a, 636m | vierte Abth. [Oligoklas (mit Augit)] (= Chimborazo-, Pichincha-Gestein) IV [471m-2a; A. 622am, 626-631a], 474a,m,e, 8m, [577e-8a], 631e, 6m | fünfte Abth. [dolerit-artige, Labrador] (= Ätna-Gestein) IV [472am, A. 631], 474e, 8m | sechste Abth. [Lencito-phyr-Tr.] IV [472m-3a, A. 631e-2m] 472e-3a —|| abwechselnd s. Basalte; Alter I (300e*); IV 281m,e, 461m, 2a*, 620me | Analyse [s. Par. 2] IV 475e*, [626m-9]; pl. -en IV 619e*: Anordnung [s. Par. 1] IV 468am*, Antagonismus s. Basalte, Anziehung IV 181m ||— Arten (auch Eigenschaften) [s. Abänderungen, Farben, Namen; s. Par. 1 u. hp. Abtheilungen] (s. hiernach noch: die 6 Arten) IV 427a*, 474me, 480m, 3a,e, 591am, 634me; -Arten (+) [s. Gegenden, °Vulk. j IV 474am | Art (°°) [s. °Vulk.]